

TARTUNTATAUDIT

Perustietoa varhaiskasvatusikäisten tartuntataudeista, niiden aiheuttajista ja tarttumisesta löytyy Terveyskirjastosta (terveyskirjasto.fi - infektiot ja päivähoito)

Yleisohje

Lapsi voi tulla varhaiskasvatukseen, kun yleisvoinniltaan pystyy osallistumaan kaikkeen toimintaan päivän aikana. Käsienpesu on tärkein ja helpoin tapa ehkäistä infektioita ja estää niiden leviäminen.

Angiina eli nielutulehdus

Oireet. Kuume, kurkkukipu, mahdollisesti oksentelu, usein vaaleat peitteet nielussa.

Eristämistarve: Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibiootihoidon aloittamisesta. Kotihoitoajan pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi.

Enterorokko

Oireet: Alkuaireina voi olla vähän kuumetta, päänsärkyä, flunssaa ja löysä vatsa. Parin päivän kuluessa suuhun, käsiin ja jalkoihin ilmaantuu rakkuloita. Tauti kestää noin viikon ja siihen ei ole olemassa erityistä hoitokeinoa.

Eristämistarve: Ei vaadi eristystä. Yleiskunto ratkaisee poissaolon.

Kihomato

Oireet: Vaihtelevia oireita; peräaukon kutina yleisin – erityisesti iltaisin nukkumaan mennessä.

Eristämistarve: Erityistoimenpiteet eivät ole tarpeen. Lääkehoito annetaan kotona ja mielellään koko perheelle samanaikaisesti.

Korvatulehdus

Oireet: Kutina. Kipu, joka pahenee korvalehteä painettaessa. Kuume, toisinaan korvavuoto.

Eristämistarve: Eristäminen ei ole tarpeen. Lapsen voi viedä hoitoon, kun yleistila ja kuume sallivat.

Märkärupi

Oireet: Märkivä, kutiseva rupi kasvoissa suun ja nenän ympärillä; saattaa raapimisen tuloksena levitä muualle kehoon.

Eristämistarve: Eristäminen 24 tuntia suun kautta otettavan ja 48 tuntia paikallisen antibiootihoidon aloittamisesta. Poissaolo varhaiskasvatuksesta niin kauan kuin märkiviä rupia esiintyy.

Nuhakuume, hengitystieinfektio

Oireet: Nuha, yskä, kurkkukipu, mahdollisesti myös kuume, väsymys.

Eristämistarve: Lapsi voidaan viedä hoitopaikkaan heti kun hänen yleistilansa ja kuume sallivat.

Ontelosyylä

Oireet: 2-6 mm:n läpimittaiset syylät iholla, pääasiassa taiteissa. Puristeltaessa tulee esiin talimaista tahnaa.

Eristämistarve: Ei eristämistarvetta.



Parvorokko

Oireet: Alkaa usein poskien punoituksesta, jota seuraa vartalosta raajoihin leviävä ihottuma. Väsymys, lievä lämpö.

Eristämistarve: Oireiden alkaessa taudin tartuttavuus on ohi, joten eristämistarvetta ei ole. Yleiskunto ratkaisee poissaolon.

Päätäit

Oireet: Jatkuva kutina, saivareet. Joskus oireeton. Päätäitä ja sen eri kehitysmuotoja löytyy yleensä hiuksista, korvien takaa ja niskasta.

Eristämistarve: Erityistoimenpiteet eivät ole tarpeen.

Ripuli/oksennustauti

Oireet: Ripuli, johon saattaa liittyä kuumetta, oksentelua ja ilmavaivoja. Noroviruksessa kouristavat vatsakivut.

Eristämistarve: Ripuloivia ja oksentelevia lapsia hoidetaan kotona, kunnes oireet loppuvat ja lapsi on ollut kahden vuorokauden ajan oireeton. Mikäli perheessä on muita varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, niin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi suositellaan, että altistuneet lapset ovat myös kotihoidossa samanaikaisesti sairastuneen lapsen kanssa.

Silmätulehdus

Oireet: Silmien punoitus, rähmiminen.

Eristämistarve: lasta, jonka silmä rähmii, ei tarvitse eristää hoidosta tartunnan vaaran vuoksi.

Oireiden voimakkuus ratkaisee poissaolotarpeen.

Syyhy

Oireet: Kutina, joka voimakkainta öisin, missä tahansa kehonosassa. Voi myös olla rakkuloita.

Eristämistarve: Eristys on aiheellinen, kunnes hoito on annettu.

Tulirokko

Oireet: Kuume, kurkkukipu, oksentelu, ihottuma, jota ei esiinny kasvoilla. "Mansikkakieli".

Eristämistarve: Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta. Kotihoitoajan pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi.

Vauvarokko, kolmen päivän kuume

Oireet: Äkillinen, korkea, nopeasti nouseva ja laskeva kuume. Kuumeen laskemisen jälkeen punatäpläinen ihottuma.

Eristämistarve: Lapsen yleiskunto ratkaisee poissaolon.

Vesirokko

Oireet: Eri vaiheessa olevia vesirakkuloita iholla, myös hiuspohjassa. Kuume ja voimakas kutina.

Eristämistarve: Rokottamaton lapsi eristetään, kunnes ruvet ovat kuivuneet, mikä yleensä tapahtuu 5–6 vuorokaudessa ihottuman puhkeamisesta. Rokotettu lapsi voi palata hoitoon, kun uusia ihomuutoksia ei enää ilmaannu.